

Lucilie bouchère du Nouveau Monde

Quand une plaie est-elle plus qu'une simple plaie?

La lucilie bouchère du Nouveau Monde (LBNM) peut être difficile à détecter à un stade précoce. Le premier signe peut être une plaie qui ne cicatrise pas.



Signes à surveiller:

- une plaie qui s'agrandit ou s'aggrave
- un écoulement ou un saignement
- une odeur nauséabonde
- un gonflement ou une douleur
- des animaux qui lèchent, mordent, frotte ou secoue la zone concernée
- présence visible d'asticots ou de mouvements dans la plaie
- irritation autour des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche ou des parties génitales
- faiblesse, fièvre, abattement ou perte d'appétit dans les cas graves



Les plaies qui peuvent passer inaperçues:

- morsures de tiques
- piqûres d'insectes
- égratignures
- plaies perforantes
- sites chirurgicaux
- nombrils des nouveau-nés
- plaies sous les poils, les plumes, les harnais ou les colliers



Que faire si vous soupçonnez un syndrome de la plaie non traitée de la LBNM:

- Contactez rapidement un vétérinaire.
- Ne transportez pas l'animal inutilement s'il est gravement atteint.
- Ne négligez pas la présence d'asticots dans une plaie, retirez-les dès que possible.
- Conservez les informations relatives à vos déplacements, à votre lieu d'origine et à vos contacts récents avec des animaux.
- Ne jetez pas les asticots vivants à la poubelle ni à terre.
- Recueillez les asticots dans un petit récipient muni d'un couvercle hermétique et contenant de l'alcool à 70%. Contactez votre vétérinaire pour savoir comment envoyer un échantillon à l'ACIA afin de l'identifier.



Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne remplacent pas les conseils d'un vétérinaire. N'attendez pas qu'une plaie s'aggrave. Une consultation vétérinaire précoce préserve le bien-être de l'animal et favorise un dépistage précoce.