


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Influenza de type A(H5N1)

- Le Yakima Health District, en coordination avec le département de la Santé de l'État de Washington, a confirmé un cas de grippe A(H5N1) chez une personne ayant été exposée à des bovins laitiers infectés dans une exploitation laitière du comté de Yakima ; cette personne ne présente pas de forme grave de la maladie, n'a pas été hospitalisée et s'est placée en isolement à son domicile

Pour en savoir plus




Influenza aviaire hautement pathogène

- L'USDA a confirmé la présence d'IAHP H5N1 dans six troupeaux bovins laitiers supplémentaires dans l'État de Washington (tous situés, semble-t-il, dans le comté de Yakima)
- Au cours de la semaine dernière, le Canada a confirmé des foyers d'IAHP au sein d'élevages avicoles non commerciaux, notamment au Manitoba (2)

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus




Virus Shamonda-Europe

- Le Portugal a signalé la présence du SHAV-EU (clade non spécifique) dans des élevages bovins (viande et lait) répartis sur six municipalités, identifié par RT-PCR ou ELISA
- L'Espagne a signalé pour la première fois la présence du SHAV-EU dans un élevage de la province de Cadix, devenant ainsi la sixième province touchée.
- Article scientifiques : "Detection of Shamonda Virus RNA in Blood and Milk from Water Buffaloes in Southern Italy"
 - L'ARN du SHAV-EU1 a été détecté dans 10 des 15 échantillons de sang et dans les 8 échantillons de lait provenant de bufflonnes laitières présentant une baisse de production laitière

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus


Pour en savoir plus



Virus Ebola (Bundibugyo)

- Au 20 octobre 2026, un total de huit cas confirmés d'Ebola, dont un décès, ont été signalés au Kenya

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



● Trachéite hémorragique chez les porcelets en post-sevrage aux États-Unis

Agent pathogène : N/A **affections :** multiples; **Transmission :** multiples ; **Espèces concernées :** porcines

① Le syndrome de trachéite hémorragique (STH) est une affection émergente touchant les porcs en phase de post-sevrage et, moins fréquemment, en phase d'engraissement. Une étude rétrospective portant sur 422 cas de trachéite, soumis au Laboratoire de diagnostic vétérinaire de l'Université du Minnesota entre 2014 et 2026, a révélé que 139 cas (32,9 %) étaient positifs au virus de la grippe porcine (VGP). Parmi les cas négatifs pour ce virus, 118 (41,7 %) se sont révélés positifs à *Mycoplasma hyopneumoniae*. Au total, 257 des 422 cas (60,9 %) présentaient des signes de présence de l'un ou l'autre de ces agents pathogènes ; des lésions comparables ont par ailleurs été observées chez des porcs ne présentant aucun de ces deux agents. Aucune corrélation claire n'a pu être établie entre le type de lésion et l'agent infectieux détecté ; des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour déterminer le rôle exact de ces agents pathogènes respiratoires dans le STH.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,4
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	5

◆ Stomatite papuleuse bovine au Mexique

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct ; **Espèces concernées :** bétail

① Le Mexique a écarté la présence de la fièvre aphteuse chez un veau examiné à la station de quarantaine d'Agua Prieta, dans l'État de Sonora, après la détection de lésions buccales. Des échantillons envoyés au laboratoire du SENASICA, à Mexico, ont permis de confirmer la présence du virus de la stomatite papuleuse bovine et d'exclure la fièvre aphteuse en moins de 24 heures. La stomatite papuleuse bovine est une infection causée par un parapoxvirus, présente dans le monde entier ; elle se propage par contact direct avec des animaux infectés ou du matériel contaminé et provoque généralement, chez les bovins, des lésions buccales et nasales bénignes qui guérissent spontanément. Ce virus est également une zoonose professionnelle reconnue, susceptible d'entraîner des lésions cutanées localisées chez les personnes en contact direct avec des bovins infectés.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	2,3
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2.4)

<u>Influenza de type A(H5N1) aux États-Unis</u> • Le Yakima Health District , en coordination avec le département de la Santé de l'État de Washington, a confirmé un cas de grippe A(H5N1) chez une personne ayant été exposée à des bovins laitiers infectés dans une exploitation laitière du comté de Yakima ; cette personne n'a pas développé de forme grave de la maladie, n'a pas été hospitalisée et s'est placée en isolement à son domicile	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 46</u>	<u>Évaluation moyenne : 3,3</u>
<u>Virus Shamonda en Europe</u> • Le Portugal a signalé la détection du virus SHAV-EU (clade non précisé) dans des élevages bovins et laitiers répartis sur six municipalités ; ces détections ont été confirmées par RT-PCR ou ELISA • L' Espagne a signalé, pour la première fois, la présence du virus SHAV-EU dans un élevage situé dans la province de Cadix, qui devient ainsi la sixième province touchée • La France a confirmé des foyers dans 54 départements : 52 départements sont touchés au niveau des élevages bovins (dont un nouveau département, la Charente-Maritime) et 2 départements au niveau des élevages ovins	<u>Nombre de signaux : 05</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 12</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,7 - 3,0</u>
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord</u> • Au cours de la semaine dernière, le Canada a signalé des foyers d'IAHP au sein d'élevages de volailles non commerciaux, notamment au Manitoba (2 foyers). • En date du 2 octobre 2026, les laboratoires de l' ACIA avaient analysé 12 455 échantillons de lait cru provenant de camions arrivant aux usines de transformation dans toutes les provinces canadiennes ; tous les échantillons se sont révélés négatifs • Au cours de la semaine dernière, l' USDA a signalé des foyers d'IAHP dans des troupeaux avicoles dans les États suivants : Utah (2 foyers), Porto Rico (1 foyer) et Ohio (1 foyer) • Le Missouri et le Nevada ont signalé des cas d'IAHP chez des oiseaux aquatiques sauvages vivant en milieu urbain (canards et oies) • L'IAHP a été identifiée comme la cause principale du décès de Jackie , un pygargue à tête blanche de la région de Big Bear • En date du 19 octobre 2026, l' USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1188 troupeaux laitiers répartis dans 20 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Washington (8), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Texas (40), Colorado (64), Idaho (177) et Californie (773) ; Sept nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée : dans l'État de Washington (6) et au Texas (1) • Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford	<u>Nombre de signaux : 06</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 239</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
<u>Ebola (virus Bundibugyo) en Afrique de l'Est (RDC, Kenya)</u> • Au 19 octobre 2026, la RDC a confirmé 9 552 cas d'Ebola répartis dans huit provinces, incluant 4 602 décès et 2 550 guérisons. • Au 20 octobre 2026, un total de huit cas confirmés d'Ebola, dont un décès, a été signalé au Kenya	<u>Nombre de signaux : 10</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 15</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
<u>Fièvre aphteuse en Asie</u> • Chypre enregistrera officiellement environ 3 000 cas de fièvre aphteuse détectés précédemment dans cinq élevages identifiés au cours de l'été 2026, et procédera à l'abattage des animaux touchés • La Turquie continue de signaler la fermeture de marchés aux bestiaux en raison de foyers de fièvre aphteuse à travers le pays ; toutefois, aucune déclaration n'a été faite concernant l'annulation des combats de chameaux • L' Indonésie a signalé un foyer de fièvre aphteuse touchant plus de 60 buffles dans la province de Lampung ; les animaux infectés sont isolés et traités, tandis que plus de 600 buffles ont été vaccinés afin de limiter la propagation de la maladie	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 20</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8</u>
<u>Dengue à Cuba</u> • Au 4 octobre 2026, le nombre cumulé de cas de dengue à Cuba était estimé à 11 235, soit environ 9,2 fois le niveau attendu ; les quatre sérotypes de la dengue y circulent, le sérotype DENV-2 étant prédominant	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 02</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,6</u>
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis</u> • Au 19 octobre 2026, l' USDA a confirmé un total de 56 cas de MCH dans deux États : le Texas (52) et le Nouveau-Mexique (4). Au cours de la semaine écoulée, un cas supplémentaire a été signalé chez un cheval dans le comté de Brewster (Texas), ainsi qu'un cas chez un cheval et un cas chez un bovin dans le comté de Grant (Nouveau-Mexique) • La Texas Animal Health Commission a émis un nouvel arrêté, levant les restrictions dans deux zones infestées par la MCH et modifiant une troisième zone, avec l'accord de l'APHIS • Le Colorado a adopté une nouvelle réglementation d'urgence visant à contenir la propagation de la MCH ; celle-ci définit les exigences applicables aux animaux entrant dans le Colorado en provenance d'un État infesté, incluant des protocoles simplifiés pour les zones infestées, des normes d'importation internationale, ainsi que des dispositions relatives à l'application de la réglementation et à la mise en quarantaine • Medgene et la Foundation for Food & Agriculture Research ont lancé un projet, doté de près de 500 000 dollars américains, visant à développer un vaccin pour les bovins contre la MCH. Ce vaccin cible l'alimentation et le développement des larves ; toutefois, sa sécurité, son efficacité et sa viabilité commerciale restent à démontrer avant toute utilisation sur le terrain	<u>Nombre de signaux : 06</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 19</u>	<u>Évaluation moyenne : 1,8 - 2,5</u>
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Europe</u> • À travers l' Europe , des cas d'IAHP ont été signalés chez des volailles domestiques en Albanie (H5N1), tandis que des détections chez des oiseaux sauvages ont été rapportées en Allemagne et en Serbie (H5N1), ainsi qu'en Islande et en Norvège (H5N5)	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 287</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,3</u>
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie</u> • Au 19 octobre 2026, l' Australie a confirmé 713 cas d'IAHP de type H5 au sein de la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 331 en Australie-Méridionale, 71 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 245 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans les autres territoires (baie de Jervis). • L'IAHP H5 a récemment été détectée chez un éléphant de mer du Sud et un goéland dominicain sur l' île Macquarie ; il s'agit de la première détection documentée chez un mammifère marin en Tasmanie • La Tasmanie a lancé un projet pilote visant à vacciner 100 albatros à cape blanche (espèce dite « shy albatross ») contre l'IAHP H5 ; il s'agit du premier programme de vaccination au monde contre l'IAHP destiné aux albatros • La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 17</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0</u>

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Fièvre aphteuse

- ◆ *"Buffaloed in Brandenburg: Germany's first brush with foot-and-mouth disease after four decades of freedom"* [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *"A caprine mammary infection model for highly pathogenic avian influenza H5N1"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Evidence of Exposure to Highly Pathogenic Avian Influenza H5 Viruses in East Greenland Polar Bears"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Whole genome sequences of highly pathogenic H5N1 avian influenza viruses detected in felines in Bangladesh"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Distinct influenza interfaces in cattle: repeated spillovers of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) from wild birds and enzootic circulation of influenza D virus"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Infection and transmission dynamics of bovine and human influenza A H5N1 viruses in mouse and hamster models"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Pre-existing cross-subtype serological responses against H5Nx in health care workers"* [Pour en savoir plus](#)

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- ◆ *"Re-emergence of the screwworm larva Cochliomyia hominivorax (Coquerel) in Mexico and its impact as a zoonosis on public health"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Use of pour-on formulations of fluralaner in prophylactic treatments against Cochliomyia hominivorax in newborn calves under extensive grazing systems"* [Pour en savoir plus](#)

Virus Shamonda Europe

- ◆ Pré-impression: *"Detection of Shamonda Virus RNA in Blood and Milk from Water Buffaloes in Southern Italy"* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ L'OMSA appelle à renforcer la surveillance et la préparation, alors que les signalements de maladies transmises par des vecteurs sont en augmentation [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 10/15/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 20/10/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 10 – 16 octobre 2026, semaine 42 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)