


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Influenza aviaire hautement pathogène

- ◆ La **Nouvelle-Zélande** a signalé ses premiers cas d'IAHP H5 ; deux cas ont été confirmés à ce jour, un skua brun (oiseau marin) trouvé sur la plage de **Petone** et un kāhu (busard des marais) trouvé près de **Carterton**
- ◆ En date du 21 juillet 2026, 17 cas de détection d'IAHP H5 ont été confirmés chez des oiseaux sauvages en **Australie**: dix en **Australie-Occidentale**, cinq en **Australie-Méridionale** et deux en **Nouvelle-Galles du Sud**

Pour en savoir plus



Pour en savoir plus




Anaplasmosse

- ◆ Article de revue: *"Tick-borne anaplasmosis and myocarditis in eastern Ontario"*
 - L'anaplasmosse à *Anaplasma phagocytophilum* est la deuxième maladie transmise par les tiques la plus fréquente chez l'homme au **Canada**; son incidence augmente rapidement en raison de l'expansion de l'aire de répartition géographique d'*Ixodes scapularis*
 - L'article présente l'étude de cas d'un homme de 79 ans originaire d'une zone rurale de l'est de l'**Ontario**
- ◆ En date du 12 juillet 2026, on a recensé en **Ontario** 89 cas d'anaplasmosse, 651 cas de maladie de Lyme et un (1) cas d'infection par le virus Powassan

Pour en savoir plus




Pour en savoir plus



Parvovirus porcin

- ◆ **Pré-impression** : *"Emerging parvovirus associated with an outbreak in Dutch pig farms also detected in pigs and wildlife in Denmark"*
 - Le parvovirus porcin émergent détecté au **Danemark** est étroitement apparenté aux virus associés à une vaste épidémie touchant plus de 80 élevages porcins aux **Pays-Bas**
 - Le virus a également été détecté chez des renards roux au **Danemark**, aux **Pays-Bas** et en **Croatie**. La diversité génétique la plus élevée a été observée parmi les virus issus de renards, ce qui suggère la faune sauvage pourrait servir de réservoir


Pour en savoir plus




Virus Ebola (Bundibugyo)

- ◆ En date du 19 juillet 2026, la **République démocratique du Congo** a signalé un total de 2 344 cas confirmés de maladie à virus Ebola, dont 930 décès. Des rapports récents indiquent qu'il s'agit de l'épidémie d'Ebola dont la progression est la plus rapide jamais enregistrée. Pour la majorité (80 %) des nouveaux cas, la chaîne de transmission n'a pas pu être identifiée

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



■ Influenza aviaire hautement pathogène H5 en Nouvelle-Zélande

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** contact direct, aérosol, fomit; **Espèces concernées :** aviaire

① La Nouvelle-Zélande a confirmé la détection d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : un skua brun trouvé sur la plage de Petone et un *kāhu* (busard des marais) découvert près de Carterton. Bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve d'une propagation plus large au sein de la faune sauvage néo-zélandaise, les autorités renforcent les mesures de préparation et d'intervention. Au cours des 12 derniers mois, les programmes de surveillance ont permis de tester plus de 2 500 oiseaux sauvages et 12 500 volailles d'élevage pour détecter la grippe aviaire. Par ailleurs, un programme de vaccination est en cours pour 300 oiseaux reproducteurs essentiels issus de cinq des espèces aviaires les plus menacées de Nouvelle-Zélande, notamment le kākāpō, le takahē, le pluvier à front noir, l'échasse noire et la perruche à front orange.

[Pour en savoir plus](#)

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	4 - 5

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Anaplasmose au Canada	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 04	Évaluation moyenne : 3,0
- En date du 12 juillet 2026, 89 cas d'anaplasmose ont été signalés en Ontario, contre 651 cas de maladie de Lyme et un cas d'infection par le virus Powassan. - L'anaplasmose à <i>Anaplasma phagocytophilum</i> est la deuxième maladie transmise par les tiques la plus fréquente chez l'homme au Canada; son incidence augmente rapidement en raison de l'expansion de l'aire de répartition géographique d'<i>Ixodes scapularis</i>			
Influenza aviaire hautement pathogène en Australie	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 05	Évaluation moyenne : 2,3 - 3,0
En date du 21 juillet 2026, l'Australie a confirmé 17 cas de détection du virus HPAI H5 chez des oiseaux sauvages : dix en Australie-Occidentale, cinq en Australie-Méridionale et deux en Nouvelle-Galles du Sud			
Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC, Ouganda)	Nombre de signaux : 05	Nombre de semaines dans le rapport : 08	Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0
- En date du 19 juillet 2026, la République démocratique du Congo a signalé un total de 2 344 cas confirmés de maladie à virus Ebola, dont 930 décès. Des rapports récents indiquent qu'il s'agit de l'épidémie d'Ebola dont la progression est la plus rapide jamais enregistrée. Pour la majorité (80 %) des nouveaux cas la chaîne de transmission n'a pas pu être identifiée - L'Ouganda n'a signalé aucun nouveau cas confirmé depuis le 21 juin 2026 et a entamé le compte à rebours de 42 jours menant à la déclaration de la fin de l'épidémie			
Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord	Nombre de signaux : 03	Nombre de semaines dans le rapport : 226	Évaluation moyenne : 2,0 - 2,6
- Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine - Au cours de la semaine écoulée, l'USDA a signalé un foyer d'IAHP dans un élevage avicole commercial : dans l'Utah (1) - En date du 20 juillet 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1166 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), Minnesota(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(27), Texas(34), Michigan(31), Colorado(64), Idaho(173) et Californie(773). Cinq nouveaux foyers ont été signalés la semaine dernière : un en l'Idaho (1) et quatre en Utah(4) - Le Honduras a signalé un foyer d'IAHP (souche en attente d'identification) chez des volailles de basse-cour à Santa Bárbara - Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			
Virus de la maladie de Newcastle en Europe	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 12	Évaluation moyenne : 2,5
L'Espagne a signalé la propagation du virus de la maladie de Newcastle dans trois nouvelles régions (Salamanque, Ségovie et Ávila), toutes situées autour de Valladolid. Cinq (5) foyers ont été recensés dans des élevages de poulets de chair			
Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> aux États-Unis	Nombre de signaux : 08	Nombre de semaines dans le rapport : 07	Évaluation moyenne : 1,8 - 2,5
- En date du 20 juillet 2026, l'USDA a confirmé un total de 41 cas de MCH dans deux États : quarante au Texas (40) et un au Nouveau-Mexique (1). La semaine dernière, le Texas a signalé six nouveaux cas, trois chez des ovins (3), deux chez des bovins (2) et un chien (1) répartis dans cinq comtés (Pecos, Sutton, Star, Brewster et Schleicher) - La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour une formulation liquide d'ivermectine destinée aux chevaux (solution orale d'ivermectine) pour usage préventif à court terme contre <i>Cochliomyia hominivorax</i> L'Université du Wisconsin a publié des ressources concernant la prévention et la prise en charge de la MCH chez les chiens et les chats de refuges - Le Canada a imposé des restrictions à l'importation de certains animaux vivants en provenance du Texas à la suite de la détection de la MCH aux États-Unis ; les importations d'équidés, de porcins, de bovins, de caprins, de cervidés et de camélidés originaires du Texas sont suspendues. Les animaux provenant d'autres États américains restent admissibles à condition de ne pas avoir séjourné ni transité par le Texas au cours des 21 jours précédant l'exportation. Les certificats d'exportation doivent inclure de nouvelles attestations relatives à la MCH			
Stomatite vésiculeuse aux États-Unis	Nombre de signaux : 01	Nombre de semaines dans le rapport : 24	Évaluation moyenne : 2,4
L'USDA a confirmé deux nouveaux foyers de stomatite vésiculeuse dans des établissements équin de deux des comtés du Colorado nouvellement touchés (un dans le comté d'Archuleta et un dans le comté de La Plata) ainsi qu'un nouveau établissement équin présumé positif dans le comté de Valencia, au Nouveau-Mexique			
Myiase à <i>Cochliomyia hominivorax</i> en Amérique centrale et au Mexique	Nombre de signaux : 04	Nombre de semaines dans le rapport : 68	Évaluation moyenne : 1,8 - 2,4
- En date du 20 juillet 2026, le Mexique a signalé un total cumulé de 34 338 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, dans 28 États et régions - L'État de Chihuahua a signalé son premier cas d'infestation par la MCH chez un veau, dans la municipalité de Hidalgo del Parral - Le Mexique a signalé 391 cas humains d'infestation par la MCH depuis le début de l'année 2026 - Le Honduras a signalé plus de 5 500 cas cumulés d'infestation par la MCH chez les animaux depuis le signalement des premiers foyers. Toutefois, le nombre réel de cas pourrait être plus élevé, car de nombreux éleveurs ont commencé à administrer des traitements sans déclarer tous les incidents aux autorités sanitaires			
Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Sud	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 122	Évaluation moyenne : 2,2
- Le Pérou a signalé un foyer d'IAHP H5N1 chez des volailles domestiques (canards) à Lima - Le Brésil a signalé un foyer d'IAHP H5N1 chez des volailles de basse-cour dans l'État du Rio Grande do Sul			
Influenza aviaire hautement pathogène en Afrique	Nombre de signaux : 02	Nombre de semaines dans le rapport : 97	Évaluation moyenne : 2,0
Le Sénégal et le Togo ont signalé des foyers d'IAHP H5N1 chez des volailles domestiques			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- ◆ *"Range Modeling and Surveillance of Ornithodoros turicata Ticks: Implications for Detecting African Swine Fever Virus in the United States"* [Pour en savoir plus](#)

Coronavirus

- ◆ Pré-impression : *"Clade 2.3.4.4b H5N1 influenza virus and SARS-CoV-2 seroprevalence among owned and feral cats in Philadelphia and surrounding communities"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Serological evidence of SARS-CoV-2 exposure in marine mammals in the United States between 2020 and 2025"* [Pour en savoir plus](#)

Fièvre aphteuse

- ◆ *"Preliminary molecular characterization of foot-and-mouth disease virus SAT-1 toptotype III associated with recent cattle outbreaks in Syria"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Environmental Sampling Using Shoe Booties for the Detection of Foot and Mouth Disease Virus in Animal Pens"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ FAO – Évaluation rapide de l'impact économique de la propagation du virus de la fièvre aphteuse (sérotypage SAT1) en Asie et dans le Pacifique [Pour en savoir plus](#)

Influenza

- ◆ *"Rapid Expansion of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b Genotype D1.1 Virus across Flyway Regions, North America, Fall 2024"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Detection of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b Genotype D1.2 Virus in Swine after Experimental Inoculation"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *"Bovine-derived H5N1 influenza virus efficiently infects lactating swine via the mammary gland"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *"Highly Pathogenic Avian Influenza H5N5 in a Polar Bear and Atlantic Walrus, Svalbard, 2026, with Widespread Seroconversion in Polar Bears"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"High pathogenicity avian influenza A (H5N1) viruses isolated from poultry and wild birds in Japan during the 2024–2025 season"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Biosecurity deficiencies in HPAI-affected poultry farms in Korea, 2020/2021–2024/2025 seasons"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Severe pneumonia and acute respiratory distress syndrome caused by avian influenza A (H10N3) in a young female: a case report"* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ *"Tick-borne anaplasmosis and myocarditis in eastern Ontario"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Comparison of multiple antigens for use in indirect ELISAs for detection of anti-capripoxvirus antibodies in sheep, goats, and cattle"* [Pour en savoir plus](#)

Myiase à Cochliomyia hominivorax

- ◆ *"Comparative assessment of different traps performance for capturing the New World screwworm fly"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Recherche : La symbiose représente une nouvelle piste innovante dans la lutte pour maîtriser la MCH [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Pré-impression : *"Emerging parvovirus associated with an outbreak in Dutch pig farms also detected in pigs and wildlife in Denmark"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression : *"Quantifying the heterogeneity and determinants of Ebola Zaïre transmission during the 10th outbreak in DRC, 2018 – 2020"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Serologic Evidence of Hantavirus Exposure in Humans, Italy, 2004–2018"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 07/16/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 21/07/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 13-17 juillet 2026, semaine 29 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.